

附件 1

古代经典名方目录（第二批）——汉族医药

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
1	茵陈蒿汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“阳明病，发热汗出者，此为热越，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴引水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，茵陈蒿汤主之。”	茵陈蒿六两，栀子十四枚（擘），大黄二两（去皮）。	右三味，以水一斗二升，先煮茵陈，减六升，内二味，煮取三升，去滓，分三服。	汤剂
2	桂枝甘草汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸，欲得按者，桂枝甘草汤主之。”	桂枝四两（去皮），甘草二两（炙）。	右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。	汤剂
3	麻黄细辛附子汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“少阴病，始得之，反发热脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。”	麻黄二两（去节），细辛二两，附子一枚（炮，去皮，破八片）。	右三味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
4	梔子柏皮汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“伤寒身黄发热，梔子柏皮汤主之。”	肥梔子十五个（擘），甘草一两（炙），黄柏二两。	右三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。	汤剂
5	黄芩汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“太阳与少阳合病，自下利者，与黄芩汤。”	黄芩三两，芍药二两，甘草二两（炙），大枣十二枚（擘）。	右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。	汤剂
6	茯苓桂枝甘草大枣汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“发汗后，其人脐下悸者，欲作奔豚，茯苓桂枝甘草大枣汤主之。”	茯苓半斤，桂枝四两（去皮），甘草二两（炙），大枣十五枚（擘）。	右四味，以甘烂水一斗，先煮茯苓，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。	汤剂
7	附子泻心汤	《伤寒论》（汉·张仲景）“心下痞，而复恶寒汗出者，附子泻心汤主之。”	大黄二两，黄连一两，黄芩一两，附子一枚（炮，去皮，破，别煮取汁）。	右四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾绞去滓，内附子汁，分温再服。	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
8	柴胡桂枝汤	《伤寒论》（汉•张仲景）“伤寒六七日，发热，微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，柴胡桂枝汤主之。”	桂枝（去皮）、黄芩一两半，人参一两半，甘草一两（炙），半夏二合半（洗），芍药一两半，大枣六枚（擘），生姜一两半（切），柴胡四两。	右九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。	汤剂
9	通脉四逆汤	《伤寒论》（汉•张仲景）“少阴病，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止脉不出者，通脉四逆汤主之。”	甘草二两（炙），附子大者一枚（生用，去皮，破八片），干姜三两。	右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分温再服。	汤剂
10	桂枝加厚朴杏子汤	《伤寒论》（汉•张仲景）“太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。”	桂枝三两（去皮），甘草二两（炙），生姜三两（切），芍药三两，大枣十二枚（擘），厚朴二两（炙，去皮），杏仁五十枚（去皮尖）。	右七味，以水七升，微火煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。	汤剂